

2015年10月30日

各位

**ブリストル・マイヤーズ スクイブ社のオプジーボ（ニボルマブ）が
Prix Galien USA 2015 のベスト・バイオテクノロジー製品賞を受賞**

（ニュージャージー州プリンストン、2015年10月28日）ーブリストル・マイヤーズ スクイブ社（NYSE：BMY/本社：米国・ニューヨーク/CEO：ジョバンニ・カフォリオ）は、同社のPD-1免疫チェックポイント阻害薬オプジーボ（一般名：ニボルマブ）が、Prix Galien USA 2015 のベスト・バイオテクノロジー製品賞を受賞したことを発表しました。

米国では、オプジーボは2014年12月にYervoyでの治療後、かつ、BRAF V600 変異陽性の場合、BRAF 阻害剤での治療後に病勢進行が認められた切除不能または転移性悪性黒色腫の治療薬として迅速承認され、また、2015年3月に、プラチナ製剤による化学療法での治療中または治療後に進行・再発が認められた肺扁平上皮がん患者の治療の適応が追加承認されました。さらに、2015年10月に、BRAF V600 野生型で切除不能または転移性の悪性黒色腫患者を対象としたオプジーボとヤーボイの併用療法が承認されました。また同月、FDA から治療歴を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者に対する適応拡大の承認を取得しました。欧州では、2015年6月にBRAF 変異の有無にかかわらず、成人の進行期（切除不能または転移性）悪性黒色腫患者の治療薬として、2015年7月には化学療法治療後の局所進行性または転移性の肺扁平上皮がん治療薬として承認されました。

また、海外においては、現在ブリストル・マイヤーズ スクイブ社が腎細胞がん（RCC）、頭頸部がん、血液がん、膠芽腫、大腸がん、膵臓がん、胃がん、肝細胞がん、トリプルネガティブ乳がん、小細胞肺癌、尿路上皮がんなどを対象とした臨床試験を実施中です。一方、日本では、小野薬品工業株式会社が2014年9月に根治切除不能な悪性黒色腫の治療薬として発売しました。また、RCC、非小細胞肺癌、頭頸部がん、胃がん、食道がん、肝細胞がん、ホジキンリンパ腫、尿路上皮がん、膠芽腫を対象とした臨床試験を実施中です。

次頁以降にブリストル・マイヤーズ スクイブ社が発表したプレスリリース資料（和訳版）を添付していますので、ご参照ください。

以上

＜本件に関する問い合わせ＞
小野薬品工業株式会社 広報部
TEL：06-6263-5670
FAX：06-6263-2950



本資料は、米国ブリストル・マイヤーズ スクイブ社が2015年10月28日(米国現地時間)に発表しましたプレスリリースの日本語訳(抜粋)をご参考までにお届けするものです。内容につきましては原本である英文が優先します。

ブリストル・マイヤーズ スクイブ社のオプジーボ (ニボルマブ) が、 Prix Galien USA 2015 のベスト・バイオテクノロジー製品賞を受賞

- ブリストル・マイヤーズ スクイブ社のチームは、進行期悪性黒色腫および肺扁平上皮がんの治療における PD-1 免疫チェックポイント阻害薬オプジーボの科学的発見と開発に対する革新的なアプローチを称えられ、受賞しました。
- ヤーボイ (イピリムマブ) が 2012 年にベスト・バイオテクノロジー製品賞を受賞しており、今回はブリストル・マイヤーズ スクイブ社による 2 回目の Prix Galien USA の受賞になります。

(ニュージャージー州プリンストン、2015年10月28日) —ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 (NYSE : BMY/本社 : 米国・ニューヨーク/CEO : ジョバンニ・カフォリオ) は、本日、同社の PD-1 免疫チェックポイント阻害薬オプジーボ (一般名 : ニボルマブ) が、Prix Galien USA 2015 のベスト・バイオテクノロジー製品賞を受賞したことを発表しました。ブリストル・マイヤーズ スクイブ社は、治療歴を有する転移性肺扁平上皮がんの適応、および、ヤーボイ (一般名 : イピリムマブ) での治療後、かつ、BRAF V600 変異陽性の場合、BRAF 阻害薬での治療後に病勢進行が認められた切除不能または転移性悪性黒色腫において、奏効率と奏効期間に基づき迅速承認された適応における、オプジーボの革新的な発見と開発を称えられ、受賞しました。ベスト・バイオテクノロジー製品賞への申請以降、オプジーボは、米国食品医薬品局 (FDA) による 2 つのがん免疫療法薬の併用療法としての初めての承認となった、BRAF V600 野生型の切除不能または転移性の悪性黒色腫患者を対象としたオプジーボとヤーボイの併用療法や、プラチナ製剤による化学療法での治療中または治療後に進行・再発が認められた非扁平上皮非小細胞肺癌患者の治療の適応で、FDA から承認を取得しました。

発表は、2015年10月27日に9年目となる Prix Galien USA のニューヨークで開催された受賞式で発表されました。ノーベル賞受賞者数人を含む科学委員会で選出される Prix Galien USA 賞は、革新的な治療法の開発により人類の置かれている状況を改善した特筆すべき偉業を称える賞です。ブリストル・マイヤーズ スクイブ社にとってベスト・バイオテクノロジー製品賞の受賞は2回目となり、2 つのがん免疫療法薬でこの賞を受賞した唯一の会社となりました。ヤーボイは、切除不能または転移性悪性黒色腫で承認後の 2012 年にこの賞を受賞していました。この先駆的な科学に基づき、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社は治療が非常に困難ないくつかのがん腫において生存期間を延長させるために、がん免疫療法の可能性の研究を続けています。

ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼 CSO のフランシス・カス、MB BChir, FRCP は次のように述べています。「がん免疫療法が、がん治療への期待を変える一助となり、がん研究の歴史への当社の科学的な貢献が認められたことを喜ばしく思います。Prix Galien USA 2015 のベスト・バイオテクノロジー製品賞を受賞したことは、進行期悪性黒色腫や肺扁平上皮がんなどの治療が非常に困難ながん患者さんにおけるオプジーボの早期および後期の臨床プログラムでの私たちの努力が評価されたものです」。

オプジーボについて

ブリストル・マイヤーズ スクイブ社は、世界中の 8,000 人以上の患者さんを対象とし、オプジーボを複数のがん腫において単剤療法または他の治療薬との併用療法として検討する 50 件以上の臨床試験から構成される幅広いグローバル開発プログラムを展開しています。

オプジーボは、2014年7月に根治切除不能な悪性黒色腫患者の治療薬として、世界で初めて承認を取得した PD-1 免疫チェックポイント阻害剤で、現在、米国、日本、EU を含め 37 カ国以上で当局から承認されています。

米国では、オプジーボはヤーボイ (イピリムマブ) での治療後、かつ、BRAF V600 変異陽性の場合、BRAF 阻害薬での治療後に病勢進行が認められた切除不能または転移性悪性黒色腫の適応で

承認されました。また、オプジーボは、**BRAF V600** 野生型で切除不能または転移性の悪性黒色腫患者を対象とした、ヤーボイ（一般名：イピリムマブ）との併用療法で承認されました。この適応は、奏効率と奏効期間に基づき、迅速審査にて承認されました。これらの適応の承認の継続条件は、検証試験において臨床的有用性を証明し記載することです。さらに、オプジーボは、プラチナ製剤による化学療法での治療中または治療後に進行・再発が認められた非小細胞肺癌患者の治療を適応として承認を受けました。**EGFR** 変異または **ALK** 転座を有する患者さんは、オプジーボによる治療の前に、FDA が承認した治療を行い、病勢進行が認められた場合に限られます。

重要な安全性情報

※本項目の内容は米国での承認に際しての情報であり、日本国内には適用されません。

免疫介在性副作用に関する詳細は、ヤーボイの黒枠警告を含め、米国における [オプジーボ](#) と [ヤーボイ](#) の添付文書をご覧ください。

警告：免疫介在性副作用

ヤーボイを使用すると、T 細胞の活性化および増殖のため、重篤かつ致命的な免疫介在性副作用が起こる可能性があります。このような免疫介在性反応は、どの器官系でも起こり得ますが、最も一般的に見られる重篤な免疫介在性副作用は、腸炎、肝炎、皮膚炎（中毒性表皮壊死融解症など）、神経障害、内分泌障害です。これらの免疫介在性反応の大部分は、治療中に発現しましたが、ヤーボイ使用中止後、数週間から数カ月経って発現する例も少数見られました。

患者について、ベースライン時と毎回の投与前に、腸炎、皮膚炎、神経障害、および内分泌障害の徴候や症状がないかどうかを評価し、肝機能検査や甲状腺機能検査を含む臨床生化学検査の評価を行う必要があります。

重篤な免疫介在性反応が認められた場合には、ヤーボイを完全に中止し、高用量の副腎皮質ホルモン剤の全身投与を開始する必要があります。

免疫介在性肺臓炎

オプジーボの投与に関連し、致命的なケースを含む免疫介在性の肺臓炎または間質性肺疾患が報告されました。固形がんを有する臨床試験被験者において、致命的な免疫介在性肺臓炎は、オプジーボ単剤群の **0.5%**（978 例中 5 例）で報告されました。**CheckMate -037** 試験において、間質性肺疾患を含む肺臓炎がオプジーボ群の **3.4%**（268 例中 9 例）で報告され、化学療法群では、102 例中 1 例も報告されませんでした。免疫介在性の肺臓炎はオプジーボの投与を受けた患者の **2.2%**（268 例中 6 例）で発生しました。グレード 3 が 1 例、グレード 2 が 5 例でした。**CheckMate -057** 試験において、間質性肺疾患を含む、免疫介在性肺臓炎は、オプジーボの投与を受けた患者の **3.4%**（287 例中 10 例）で報告され、グレード 3 が 5 例、グレード 2 が 2 例、グレード 1 が 3 例でした。**CheckMate -069** 試験（94 例）および追加の用量探索臨床試験（94 例）を通じて、オプジーボとヤーボイを併用投与された悪性黒色腫患者 188 例において、致命的な免疫介在性の肺臓炎は患者の **0.5%**（188 例中 1 例）で発生しました。**CheckMate -069** 試験では更に 6 例で呼吸器症状が回復することなく死亡しました。肺臓炎の X 線画像の徴候や症状がないか、患者さんをモニターしてください。グレード 2 以上の肺臓炎については、副腎皮質ホルモン剤を投与します。グレード 3 または 4 の肺臓炎については、オプジーボの投与を完全に中止し、グレード 2 については消失するまでオプジーボの投与を中断してください。**CheckMate -069** 試験では、間質性肺疾患を含む肺臓炎がオプジーボとヤーボイの併用投与群の **10%**（94 例中 9 例）で発生し、ヤーボイ投与群では **2.2%**（46 例中 1 例）で発生しました。免疫介在性の肺臓炎はオプジーボとヤーボイの併用投与を受けた患者の **6%**（94 例中 6 例）で発生し、うちグレード 5 は 1 例、グレード 3 は 2 例、グレード 2 は 3 例でした。

免疫介在性大腸炎

免疫介在性大腸炎がオプジーボの投与により発生する可能性があります。大腸炎について、患者さんをモニターしてください。グレード 2（5 日間以上持続した場合）、3 または 4 の大腸炎については、副腎皮質ホルモン剤を投与します。単剤投与の場合、グレード 2 または 3 については、投与を中断します。グレード 4 または再発性の大腸炎については、オプジーボの投与を完全に中止してください。ヤーボイとの併用投与の場合、グレード 2 についてはオプジーボの投与を中断し、グレード 3 または 4、再発性の大腸炎については、オプジーボの投与を完全に中止してください。

CheckMate -037 試験において、オブジーボ群の 21% (268 例中 57 例)、化学療法群の 18% (102 例中 18 例) で大腸炎/下痢が報告されました。免疫介在性大腸炎はオブジーボの投与を受けた患者の 2.2% (268 例中 6 例) で発生し、うち、グレード 3 は 5 例、グレード 2 は 1 例でした。

CheckMate -057 試験では、下痢や大腸炎がオブジーボ群の 17% (287 例中 50 例) で報告されました。免疫介在性大腸炎は患者の 2.4% (287 例中 7 例) で発生し、うち、グレード 3 は 3 例、グレード 2 は 2 例、グレード 1 は 2 例でした。CheckMate -069 試験では、オブジーボとヤーボイの併用投与を受けた患者の 57% (94 例中 54 例)、ヤーボイ投与群の 46% (46 例中 21 例) で大腸炎または下痢が報告されました。免疫介在性大腸炎は、オブジーボとヤーボイの併用投与を受けた患者の 33% (94 例中 31 例) で発生し、うち グレード 4 は 1 例、グレード 3 は 16 例、グレード 2 は 9 例、グレード 1 は 5 例でした。

異なる第Ⅲ相試験でヤーボイの投与を受けた患者において、重篤、生命にかかわる、あるいは致死性的 (ベースラインを 7 回以上上回る下痢、発熱、腸閉塞、腹膜刺激症状、グレード 3~5) な免疫介在性腸炎が 34 例 (7%) で発生しました。臨床試験全体 (511 例) でヤーボイを投与された患者において、5 例 (1%) で腸穿孔が発生し、4 例 (0.8%) が合併症で死亡し、26 例 (5%) が重度の腸炎により入院しました。

免疫介在性肝炎

免疫介在性肝炎がオブジーボの投与により発生する可能性があります。投与前、および投与期間中は定期的に、肝機能検査値異常がないかどうかモニターしてください。グレード 2 以上のトランスアミナーゼ上昇については、副腎皮質ホルモン剤を投与します。グレード 2 については投与を中断し、グレード 3 または 4 の免疫介在性肝炎については投与を完全に中止してください。

CheckMate -037 試験において、肝機能検査値異常は、オブジーボ群の方が化学療法群よりも多く見られ、AST 上昇 (オブジーボ群 28% に対して化学療法群 12%)、アルカリホスファターゼ (ALP) 上昇 (オブジーボ群 22% に対して化学療法群 13%)、アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT) 上昇 (オブジーボ群 16% に対して化学療法群 5%)、総ビリルビン上昇 (オブジーボ群 9% に対して化学療法群 0) となりました。免疫介在性肝炎はオブジーボの投与を受けた患者の 1.1% (268 例中 3 例) で発生しました。グレード 3 が 2 例、グレード 2 が 1 例でした。CheckMate -057 試験では、1 人の患者 (0.3%) が、免疫介在性肝炎を発症しました。CheckMate -069 試験では、免疫介在性肝炎は、オブジーボとヤーボイの併用投与を受けた患者の 15% (94 例中 14 例) で発生し、うち グレード 4 は 3 例、グレード 3 は 9 例、グレード 2 は 2 例でした。

異なる第Ⅲ相試験でヤーボイの投与を受けた患者において、重篤、生命にかかわる、あるいは致死的な肝毒性 (AST または ALT の上昇が基準値上限 (ULN) の 5 倍超、または総ビリルビン上昇が ULN の 3 倍超、グレード 3~5) が 8 例 (2%) 発生し、そのうち 0.2% で致死的な肝不全、0.4% で入院しました。

免疫介在性皮膚炎

異なる第Ⅲ相試験でヤーボイの投与を受けた患者において、重篤、生命にかかわる、あるいは致死的な免疫介在性皮膚炎 (スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死融解症、または真皮全層の潰瘍・壊死・水疱・出血の兆候によって悪化した皮疹など、グレード 3~5) が 13 例 (2.5%) 発生しました。中毒性表皮壊死融解症による死亡が 1 例 (0.2%) 発生しました。他に、重篤な皮膚炎により、1 例が入院しました。

免疫介在性神経障害

異なる第Ⅲ相試験でヤーボイの投与を受けた患者において、重篤、生命にかかわる、あるいは致死的なギランバレー症候群が 1 例、重篤な (グレード 3) 末梢運動神経障害が 1 例報告されました。

免疫介在性内分泌障害

下垂体炎、副腎機能不全、甲状腺障害がオブジーボの投与により発生する可能性があります。投与前および投与後に、下垂体炎や副腎機能不全の兆候や症状、甲状腺障害がないか、投与前および投与中定期的に患者さんをモニターしてください。グレード 2 以上の下垂体炎については、副腎皮質ホルモン剤を投与します。グレード 2 または 3 については投与を中断し、グレード 4 については投与を完全に中止してください。グレード 3 または 4 の副腎機能不全については、副腎皮質ホルモ

ン剤を投与します。グレード2については投与を中断し、グレード3または4については投与を完全に中止してください。甲状腺機能低下症については、ホルモン補充療法を行います。甲状腺機能亢進症をコントロールのためには、内科的治療を開始してください。

CheckMate -069 試験では、下垂体炎がオプジーボとヤーボイの併用療法を受けた患者の13% (94例中12例) で発生し、うちグレード3は2例、グレード2は10例でした。副腎不全は、オプジーボ単剤投与を受けた患者 (555例) の1%で発生しました。**CheckMate -069** 試験では、副腎機能不全がオプジーボとヤーボイの併用療法を受けた患者の9% (94例中8例) で発生し、うちグレード3は3例、グレード2は4例、グレード1は1例でした。**CheckMate -069** 試験では、甲状腺機能低下症がオプジーボとヤーボイの併用療法を受けた患者の19% (94例中18例) で発生し、グレード3の自己免疫甲状腺炎の1例を除き、すべて重篤度はグレード1または2でした。グレード1の甲状腺機能亢進症が、オプジーボとヤーボイの併用療法を受けた患者の2.1% (94例中2例) で発生しました。**CheckMate-037** 試験において、グレード1または2の甲状腺機能低下症は、オプジーボ群の8% (268例中21例) で報告され、化学療法群では、102例中1例も報告されませんでした。グレード1または2の甲状腺機能亢進症は、オプジーボ群の3% (268例中8例)、化学療法群の1% (102例中1例) で報告されました。**CheckMate -057** 試験では、オプジーボ単剤投与の患者のうち、甲状腺機能低下症は甲状腺炎を含め7% (287例中20例) で発生し、甲状腺刺激ホルモンの上昇は17%で発生しました。グレード1または2の甲状腺機能亢進症は患者の1.4% (287例中4例) で発生しました。

異なる第Ⅲ相試験でヤーボイの投与を受けた患者において、重篤または生命にかかわる免疫介在性内分泌障害 (入院や緊急の医療介入を要するもの、または日常生活に支障を来すもの、グレード3~4) が9例 (1.8%) 発生しました。9例すべてに下垂体機能低下症が見られ、一部は、副腎機能不全、性腺機能低下症、甲状腺機能低下症などの内分泌障害を併発していました。9例中6例は、重篤な内分泌障害のために入院しました。

免疫介在性腎炎および腎機能障害

免疫介在性腎炎がオプジーボの投与により発生する可能性があります。投与前、および投与期間中は定期的に、血清クレアチニン上昇が見られないかどうかモニターしてください。グレード2または3の血清クレアチニン上昇については、投与を中断し、副腎皮質ホルモン剤を投与します。悪化した場合、または改善が見られない場合は、投与を完全に中止してください。グレード4の血清クレアチニン上昇については、副腎皮質ホルモン剤を投与し、オプジーボまたはヤーボイの投与を完全に中止してください。**CheckMate-037** 試験において、クレアチニン値上昇は、オプジーボ群の方が化学療法群よりも多く見られました (オプジーボ群13%に対して化学療法群9%)。グレード2または3の免疫介在性腎炎または腎機能障害が0.7% (268例中2例) で発生しました。**CheckMate -057** 試験では、グレード2の免疫介在性腎機能障害がオプジーボ単剤投与の患者の0.3% (287例中1例) で発生しました。**CheckMate -069** 試験では、グレード2かそれ以上の免疫介在性腎炎および腎機能障害が2.1% (94例中2例) で発生し、うち1例は腎機能障害が改善することなく死亡しました。

免疫介在性発疹

免疫介在性発疹がオプジーボの投与により発生する可能性があります。発疹について患者さんをモニターしてください。グレード3または4の発疹については、副腎皮質ホルモン剤を投与します。グレード3については投与を中断し、グレード4については投与を完全に中止してください。**CheckMate-037** 試験 (268例) における発疹の発現率は21%、グレード3または4の発現率は0.4%でした。**CheckMate -057** 試験では、グレード3の4例を含め、免疫介在性の発疹がオプジーボ単剤投与の患者の6% (287例中17例) で発生しました。**CheckMate -069** 試験では、免疫介在性発疹がオプジーボとヤーボイの併用療法を受けた患者の37% (94例中35例) で発生し、うちグレード3が6例、グレード2が10例、グレード1が19例でした。

免疫介在性脳炎

オプジーボの投与により免疫介在性脳炎が発生する可能性があります。中等度から重度の神経的な徴候や症状を新たに発症した患者についてはオプジーボの投与を中断し、その他の原因を除外するために評価してください。その他の原因が除外された場合には、免疫介在性脳炎については、副腎皮質ホルモン剤を投与し、オプジーボの投与を完全に中止してください。臨床試験において単剤

またはイピリムマブとの併用でオプジーボの投与を受けた 8,490 人の患者さんの 1%未満で脳炎が認められました。CheckMate -057 試験では、オプジーボの投与を受けた患者さん 1 例 (0.3%) で致死的な辺縁系脳炎が発現しました。

その他の免疫介在性副作用

副作用の重篤度に基づき、投与を完全に中止または中断し、高用量の副腎皮質ホルモン剤を投与し、必要に応じてホルモン補充療法を開始してください。次の免疫介在性副作用がオプジーボ単剤投与を受けた患者 (555 例) の 2%未満で発生しました。：ブドウ膜炎、膵炎、顔面および外転神経不全麻痺、脱髄、自己免疫性神経障害、運動機能障害および血管炎。オプジーボが 3 mg/kg と 10 mg/kg 単剤投与された臨床試験で、臨床的に著しく発生した次の免疫介在性の副作用が確認されました。：糖尿病、糖尿病性ケトアシドーシスおよび筋無力症候群。CheckMate -069 試験では、次の臨床的に著しい免疫介在性副作用がオプジーボとヤーボイの併用療法を受けた患者の 1%で発生しました。ギランバレー症候群、下垂体機能低下症。次の臨床的に著しい免疫介在性副作用がオプジーボとヤーボイの併用療法の臨床試験で確認されました。：ブドウ膜炎、サルコイドーシス、十二指腸炎、膵炎、および胃炎。

インフュージョン・リアクション

重度のインフュージョン・リアクションは、臨床試験でオプジーボ単剤投与を受けた患者の 1%未満で報告されました。CheckMate -057 試験では、グレード 2 のインフュージョン・リアクションがオプジーボ単剤投与を受けた患者の 1% (287 例中 3 例) で発生しました。CheckMate -069 試験で、グレード 2 のインフュージョン・リアクションはヤーボイとオプジーボの併用療法を受けた患者の 3% (94 例中 3 例) で発生しました。重度または生命を脅かすインフュージョン・リアクションの患者では、オプジーボの投与を中止します。軽度または中等度のインフュージョン・リアクションを有する患者は、中断もしくは投与速度を低下させます。

胚・胎児毒性

作用機序に基づき、オプジーボは、妊婦に投与すると胎児に悪影響を及ぼす可能性があります。妊娠中の女性には、胎児へのリスクを説明してください。妊娠の可能性のある女性には、オプジーボを含む併用療法の投与を受けている期間、および最後に投与してから少なくとも 5 カ月間は、効果的な避妊法を用いるよう助言してください。

授乳

オプジーボの母乳中への移行については確認されていません。抗体を含む多くの薬剤は母乳に移行します。オプジーボを含む治療は、授乳中の乳児に重篤な副作用を引き起こす可能性があるため、治療中は授乳を中止するよう助言してください。

重篤な副作用

CheckMate-037 試験において、オプジーボ投与群の 41%で重篤な副作用が報告されました。グレード 3 または 4 の副作用はオプジーボ群の 42%で報告されました。オプジーボ投与群の 2%以上 5%未満で最も多く報告されたグレード 3 または 4 の副作用の内、腹痛、低ナトリウム血症、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ上昇、そしてリパーゼ上昇でした。CheckMate -057 試験において、重篤な副作用は、オプジーボ群の 47%で報告されました。患者群の 2%以上で報告された副作用の内、最も多く報告された重篤な副作用は肺炎、肺塞栓症、呼吸困難、胸水、そして呼吸不全でした。CheckMate -069 試験では、重篤な副作用は、オプジーボの投与を受けた患者の 62%で発生しました。ヤーボイとの併用療法では、報告された最も多く発生する重篤な副作用は、ヤーボイ単剤療法と比べて、大腸炎 (17%対 9%)、下痢 (9%対 7%)、発熱 (6%対 7%) および肺臓炎 (5%対 0) でした。

一般的な副作用

CheckMate -037 試験で最も一般的に (20%以上) 報告された副作用は、発疹 (21%) でした。CheckMate -057 試験で最も一般的に (20%以上) 報告された副作用は、疲労 (49%)、筋骨格痛 (36%)、咳 (30%)、食欲減退 (29%)、便秘 (23%) でした。CheckMate -069 試験で、最も一般的に (20%以上) 報告された副作用は、オプジーボとヤーボイの併用群対ヤーボイ単剤群で発疹

(67%:57%)、そう痒 (37%:26%)、頭痛 (24%:20%)、嘔吐 (23%:15%)、および大腸炎 (22%:11%) でした。

異なる第Ⅲ相試験でヤーボイの投与を受けた患者において、ヤーボイ 3 mg/kg の投与を受けた患者において最も一般的 (5%以上) に見られた副作用は、疲労 (41%)、下痢 (32%)、そう痒症 (31%)、発疹 (29%)、大腸炎 (8%) でした。

ブリistol・マイヤーズ スクイブ社と小野薬品工業の提携について

2011年、ブリistol・マイヤーズ スクイブ社は、小野薬品工業と締結した提携契約により、当時、小野薬品工業がすべての権利を保有していた日本、韓国、台湾を除く世界各国におけるオプジーボの開発・商業化に関する権利を獲得しました。2014年7月23日、ブリistol・マイヤーズ スクイブ社と小野薬品工業は、この戦略的提携契約をさらに拡張し、日本、韓国、台湾のがん患者さん向けに複数の免疫療法薬を単剤療法および併用療法として共同開発・商業化することを合意しました。

ブリistol・マイヤーズ スクイブ社について

ブリistol・マイヤーズ スクイブ社は、深刻な病気を抱える患者さんを助けるための革新的な医薬品を開発し、提供することを使命とするグローバルなバイオファーマ製薬企業です。詳細については、www.bms.com <米国本社ウェブサイト (英語)> またはツイッター (<http://twitter.com/bmsnews>) をご覧ください。

ブリistol・マイヤーズ スクイブ社の将来予測等に関する記述

本プレスリリースは、医薬品の研究、開発、および販売について、1995年民間有価証券訴訟改正法の趣旨の範疇に含まれる「将来予測に関する記述」を含んでいます。そうした将来予測に関する記述は現在の予想に基づくものであり、遅延、転換または変更を来す内在的リスクと不確実性を伴っており、実際の成果または業績が現在の予想と大きく異なる結果となる可能性があります。将来予測に関するいかなる記述も保証されるものではありません。本プレスリリースの将来予測に関する記述は、ブリistol・マイヤーズ スクイブ社の事業に影響を与える多くの不確定要素、特にブリistol・マイヤーズ スクイブ社の2014年12月31日に終了した事業年度通期報告書 (Form 10-K)、四半期報告書 (Form 10-Q) および当期報告書 (Form 8-K) にリスク要因として記されている不確定要素と共に評価されるべきです。ブリistol・マイヤーズ スクイブ社は、新たな知見、今後の出来事等に因るか否かを問わず、一切の将来予測等に関する記述について、公に更新する義務を負うものではありません。