

イメンド[®]カプセルを服用される患者さんへ

服用前に、必ずお読みください

イメンド[®]カプセルは、抗がん剤治療をお受けになられる患者さんが飲むお薬で、吐き気や嘔吐を抑える効果があります。

! 125mg と 80mg の **2種類** があります。

1日目に飲むお薬です

125mg

2日目、3日目に飲むお薬です


80mg

シートを切らないでください

服用方法について


以下の用法を守って、3日間続けて服用してください。

1日目 抗がん剤投与1時間～1時間30分前




抗がん剤投与開始の1時間～1時間30分前に125mgカプセルを1個服用してください。

2日目 午前中 ※食前でも食後でも構いません



2日目は、午前中に80mgカプセルを1個服用してください。


3日目 午前中 ※食前でも食後でも構いません



3日目は、午前中に80mgカプセルを1個服用してください。

! イメンド[®]カプセルは、吐き気や嘔吐を予防するお薬です。吐き気や嘔吐が起こっていない場合でも、主治医の指示に従い、規則正しく服用するようにしてください。

副作用について

 抗がん剤治療中は、体力が低下したり、精神的に不安定になりやすく、副作用による様々な症状が現れてきます。服用中に、下記のような症状に気付いた時には、すぐに主治医、看護師、薬剤師などにご相談下さい。

- 全身に湿疹がみられる。
- 顔や首、くちびる、舌、喉などが腫れる。
- 息苦しくなる。
- 発熱、紅斑（赤い斑点）、かゆみ、水ぶくれ、眼の充血、口内炎などの症状がみられる。
- みぞおちからお腹の上部にかけての激しい痛みや、吐血・下血などの症状がみられる。

イメンド[®]カプセルを服用される患者さんへ

服用前に、必ずお読みください


イメンド[®]カプセルは、抗がん剤治療をお受けになられる患者さんが飲むお薬で、吐き気や嘔吐を抑える効果があります。

! 125mg と 80mg の **2種類** があります。




1日目に飲むお薬です

125mg




2日目に飲むお薬です

80mg



3日目に飲むお薬です


80mg



服用方法について

以下の用法を守って、3日間続けて服用してください。

1日目 抗がん剤投与1時間～1時間30分前



抗がん剤投与開始の1時間～1時間30分前に125mgカプセルを1個服用してください。

2日目 午前中
※食前でも食後でも構いません



2日目は、午前中に80mgカプセルを1個服用してください。

3日目 午前中
※食前でも食後でも構いません




3日目は、午前中に80mgカプセルを1個服用してください。



イメンド[®]カプセルは、吐き気や嘔吐を予防するお薬です。吐き気や嘔吐が起こっていない場合でも、主治医の指示に従い、規則正しく服用するようにしてください。
また、治療内容や病状によっては4日目以降も服用する場合があります。

副作用について

 抗がん剤治療中は、体力が低下したり、精神的に不安定になりやすく、副作用による様々な症状が現れてきます。服用中に、下記のような症状に気付いた時には、すぐに主治医、看護師、薬剤師などにご相談下さい。

- 全身に湿疹がみられる。
- 顔や首、くちびる、舌、喉などが腫れる。
- 息苦しくなる。
- 発熱、紅斑（赤い斑点）、かゆみ、水ぶくれ、眼の充血、口内炎などの症状がみられる。
- みぞおちからお腹の上部にかけての激しい痛みや、吐血・下血などの症状がみられる。