

# オペジーボの動向について


平成29年11月7日

## オプジーボ推定実消化構成比(新患・継続)

実消化金額(仕切価換算@百万円)


■ 新規患者

■ 継続患者



# 患者数

## オプジーボ推定患者数構成比(新患・継続)



# オプジーボの癌腫毎の平均投与期間

## 推定投与期間

開発治験時の癌腫毎の治療ライン別のPFSのカプランマイヤーカーブから癌腫毎の平均の投与期間を推定

メラノーマ	:5ヶ月
肺がん	:4.5ヶ月
腎細胞がん	:9.5ヶ月
ホジキンリンパ腫	:18か月
頭頸部癌	:4.5ヶ月程度

## DPCレセプトデータから見た肺がんでのオプジーボの平均投与期間

対象:肺がんでの効能追加直後から3ヶ月間以内に使用が開始されました患者さん

平均投与期間	2ndL	5か月
	3rdL	3か月


※但し、この中には現在も投与継続中の患者さんが含まれております事から時間の経過と共に平均の投与期間は更に長くなるものと見込んでおります



---

# Gastric Cancer


# Patient Flow(2017)



Source: CancerMPact、定量調査2017

# オプジーボ胃癌処方患者数


単位:人



# オペジーボ対象Dr別ポジショニング状況

全国

## OPDポジショニング



MR報告

施設数 : 329軒

調査医師: 1923人